



# Impfkalender

Alter	Schutzimpfung	Hinweis
Ab Beginn des 3. Monats	Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), Tetanus (Wundstarrkrampf), Polymyelitis (Kinderlähmung), Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (Gelbsucht), Pneumokokken	drei Mal im Abstand von vier Wochen; Kombinationsimpfstoffe verfügbar
Ab Beginn des 12. bis 15. Monats	Polymyelitis, Haemophilus influenzae Typ b, Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Wundstarrkrampf), Hepatitis B, Pneumokokken Masern, Mumps und Röteln Windpocken Meningokokken Typ C	vierte Impfung erste Impfung (Kombinationsimpfstoff) eine Impfung eine Impfung
16. - 24. Monat	Masern, Mumps und Röteln	zweite Impfung
Ab Beginn des 5. Jahres	Tetanus, Diphtherie, Pertussis	Auffrischimpfung
9-17 Jahre	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis Hepatitis B Windpocken	Auffrischimpfung Grundimmunisierung nicht geimpfter Jugendlicher, Komplettierung des Impfschutzes nicht geimpfte und bisher nicht erkrankte Jugendliche
12-17 Jahre	Gebärmutterhalskrebs (HPV)	drei Impfungen
18-60 Jahre	Diphtherie, Tetanus	jeweils zehn Jahre nach der letzten Impfung
Ab 60 Jahre	Influenza Pneumokokken	jährlich alle sechs Jahre