



Impfkalender

Alter	Schutzimpfung	Hinweis
Ab Beginn des 3. Monats	Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), Tetanus (Wundstarrkrampf), Polymyelitis (Kinderlähmung), Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (Gelbsucht), Pneumokokken	drei Mal im Abstand von vier Wochen; Kombinationsimpfstoffe verfügbar
Ab Beginn des 12. bis 15. Monats	Polymyelitis, Haemophilus influenzae Typ b, Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Wundstarrkrampf), Hepatitis B, Pneumokokken Masern, Mumps, Röteln, Windpocken Meningokokken Typ C	vierte Impfung erste Impfung (Kombinationsimpfstoff) eine Impfung
16.–24. Monat	Masern, Mumps, Röteln, Windpocken	zweite Impfung (Kombinationsimpfstoff)
Ab Beginn des 5. Jahres	Tetanus, Diphtherie, Pertussis	Auffrischimpfung
9–17 Jahre	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis Hepatitis B Windpocken	Auffrischimpfung Grundimmunisierung nicht geimpfter Jugendlicher, Komplettierung des Impfschutzes nicht geimpfte und bisher nicht erkrankte Jugendliche
12–17 Jahre	Gebärmutterhalskrebs (HPV)	drei Impfungen
18–60 Jahre	Diphtherie, Tetanus Pertussis	Jeweils zehn Jahre nach der letzten Impfung einmalig, Kombination mit Diphtherie und Tetanus
Ab 60 Jahre	Influenza Pneumokokken	jährlich einmalig